

## COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

### REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° , DE 2022 (Da Sra. REJANE DIAS)

Requer informações sobre as providências adotadas pelo Ministério da Saúde a respeito da “varíola dos macacos”.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, no sentido de esclarecer esta Casa quanto às providências que estão sendo adotadas para lidar com o crescente surgimento de casos de “varíola dos macacos”.

### JUSTIFICAÇÃO

A Organização Mundial de Saúde comunicou que o Surto<sup>1</sup> do vírus monkeypox conhecido como de varíola dos macacos, já foi confirmado em 16 países e várias regiões do mundo. Há mais de 1.600 casos confirmados<sup>2</sup>.

Os sintomas são similares ao da varíola, porém menos severos, incluindo lesões na pele e febres, que em casos mais severos podem durar entre duas a quatro semanas.

---

1 <https://brasil.un.org/pt-br/183321-surto-de-variola-dos-macacos-ainda-pode-ser-controlado-garante-oms>

2 <https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/06/15/oms-por-que-variola-dos-macacos-vai-mudar-de-nome.ghtml>



\* C D 2 2 6 9 0 6 8 7 4 5 0 0 \*

A Organização Mundial de Saúde – OMS explicou que a varíola de macacos é transmitida pelo contato pele-a-pele, mas o vírus também pode ser transmitido pela roupa de cama contaminada ou por partículas da respiração.

Apesar de ser considerada uma doença silvestre o período de incubação varia entre 6 a 13 dias.

A vacinação contra a varíola tradicional é eficaz também para a varíola dos macacos. Mas a OMS explicou que as pessoas com 50 anos ou menos podem estar mais suscetíveis já que as campanhas de vacinação contra a varíola foram interrompidas pelo mundo quando a doença foi erradicada em 1980.

A varíola dos macacos é considerada uma zoonose viral, na qual o vírus *monkeypox* é transmitido de animais a seres humanos e estes passam a apresentar sintomas muito semelhantes aos observados em pacientes com varíola. As infecções de humanos por animais ocorrem principalmente em áreas florestais da África Central e Ocidental. A transmissão ocorre por contato com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. A varíola dos macacos geralmente é clinicamente menos grave do que a varíola comum, mas pode ser mais grave em alguns indivíduos, a exemplo de crianças, mulheres grávidas e imunossuprimidos.

Em virtude dos milhares de casos confirmados de varíola dos macacos no mundo e à chegada da doença ao Brasil, é imperativo saber quais são as medidas que estão sendo adotadas pelo Ministério da Saúde, inclusive no que se refere a vacinação e a estudos de que o governo brasileiro esteja participando.

Sala das Sessões, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

**Deputada REJANE DIAS**

