



CÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇÃO N.º 244, DE 2023 (Da Sra. Maria do Rosário)

Sugere ao Ministério da Saúde que tome providências para garantir a vacinação contra Herpes Zóster para a população com idade superior a 50 anos.

DESPACHO:
PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE E, APÓS, ARQUIVE-SE.

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD

Indicação nº de 2023

(da Sra. Maria do Rosário)

Sugere ao Ministério da Saúde que tome providências para garantir a vacinação contra Herpes Zóster para a população com idade superior a 50 anos.

Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde.

Sugere-se ao Ministério da Saúde que tome providências para disponibilizar gratuitamente a vacina contra Herpes Zóster na rede pública de saúde para as pessoas com mais de 50 anos, pelas razões que seguem.

De acordo com o próprio portal do Ministério da Saúde¹, a Herpes Zóster é uma doença causada pelo Vírus Varicela-Zóster (VVZ), isto é, o mesmo vírus causador da varicela. Ainda de acordo com informações disponibilizadas no portal do Ministério da Saúde, o Herpes-Zóster pode provocar complicações como a Ataxia cerebelar²; a Trombocitopenia³; a infecção bacteriana secundária de pele⁴; a Síndrome de Reye⁵; a infecção fetal⁶; a varicela disseminada ou

1 Disponível em < <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/herpes>>; Acesso em 10 de março de 2023;

2 Que pode afetar o equilíbrio, fala, deglutição, movimento dos olhos, mãos, pernas, dedos e braços;

3 Leva a baixa quantidade de plaquetas, responsáveis pela coagulação, no sangue;

4 Impetigo, abscesso, celulite, erisipela, causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ou outras que podem levar a quadros sistêmicos de sepse, com artrite, pneumonia, endocardite, encefalite ou meningite e glomerulonefrite;

5 Doença rara que causa inflamação no cérebro e que pode ser fatal, associada ao uso de AAS, principalmente em crianças;

6 Durante a gestação, pode levar à embriopatia, com síndrome da varicela congênita - expressa-se com um ou mais dos seguintes sinais: malformação das



varicela hemorrágica em pessoas com comprometimento imunológico e; a nevralgia pós-herpética (NPH)⁷.

Entre as principais medidas de prevenções está justamente a vacinação. De acordo com o UOL⁸, qualquer indivíduo que teve catapora ou contato com o seu causador - o vírus varicela zoster - pode em algum momento ter herpes-zóster. Entretanto, como o tempo de incubação é dilatado, mais de 60% dos casos ocorrem após os 50 anos, por isso a indicação da vacina é para pessoas a partir desta faixa etária.

Diante desse quadro, somado ao fato de que os custos da vacinação para Herpes-Zóster tornam a vacina inacessível para a maior parte da população brasileira, e em atenção ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal, vide seus Art. 6º, Art. 23, II e Art. 196, sugerimos que o Ministério da Saúde tome providências para garantir o acesso gratuito à vacinação para referida doença para a população com idade superior a 50 anos.

Sala das Sessões, em de 2023

Deputada Maria do Rosário

extremidades dos membros, microftalmia, catarata, atrofia óptica e do sistema nervoso central;

7 Dor persistente por 4 a 6 semanas após a erupção cutânea, que se caracteriza pela refratariedade ao tratamento. É mais frequente em mulheres e após comprometimento do trigêmeo.

8 Disponível em <<https://drauziovarella.uol.com.br/infectologia/vacina-contra-herpes-zoster-e-eficaz-mas-tem-alto-custo/>> Acesso em 10 de março de 2013;

