## REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 2024

(Da Sra. Rogéria Santos)

Requer que sejam solicitadas informações ao Ministério da Saúde, acerca das medidas adotadas para que os homens tenham acesso a ressonância nuclear magnética e ao rastreamento por PSA como prevenção ao câncer da próstata.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, com base no art. 50 da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Ministério da Saúde, acerca das medidas adotadas para que os homens tenham acesso ressonância nuclear magnética e ao rastreamento por PSA como prevenção ao câncer da próstata.


## **JUSTIFICAÇÃO**

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, atrás do câncer de pele não melanoma. Entre os fatores de risco para o desenvolvimento do tumor estão o tabagismo, a idade, o sobrepeso e a obesidade, além de exposições a certos produtos químicos, de acordo com o Ministério da Saúde. No entanto, o câncer também pode ser hereditário.

Um estudo publicado na terça-feira (5) projeta que as mortes por câncer terão um aumento de 89,7% até 2050, em comparação com 2022. Além disso, os casos da doença também devem crescer 76,6% nas próximas décadas em relação ao mesmo período. As projeções foram publicadas no jornal JAMA Network Open<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mortes-por-cancer-devem-aumentar-em-90-ate-2050-diz-estudo/





O estudo descobriu que, até 2050, o número total de casos de câncer deverá aumentar para 35,3 milhões — em 2022, esse número foi de 20 milhões. Além disso, a estimativa é de que ocorram 18,5 milhões de mortes por câncer, em comparação com 9,7 milhões em 2022.

Além disso, o trabalho sugere que o número de mortes poderá quase triplicar em países com baixo IDH até 2050 (um aumento de 146,1%), em comparação com o aumento moderado em países com IDH muito alto (um aumento de 56,8%). A mesma disparidade deve ocorrer em relação à incidência da doença, com 142,1% de aumento nos países de baixo IDH, em comparação com 41,7% de crescimento nos países de alto IDH.

Os homens tiveram uma incidência maior e um número maior de mortes em 2022 do que as mulheres, com essa disparidade projetada para aumentar em até 16% em 2050, segundo o estudo. Segundo especialista compreender a relação entre a Síndrome de Lynch e o câncer de próstata é fundamental é um ponto importante não só para a identificação precoce de mutações, mas também para intervenções que podem salvar vidas. Homens com histórico familiar dessa síndrome devem ser incentivados a realizar acompanhamentos regulares, uma vez que a detecção antecipada do câncer de próstata pode levar a melhores desfechos clínicos.

Além do rastreamento por PSA, hoje para alguns casos de maior risco tem sido recomendado a ressonância nuclear magnética da próstata, como medida de diagnóstico precoce.

Ante o exposto, solicitamos o apoio para a aprovação do presente Requerimento de Informações, acerca das medidas adotadas para que os homens tenham acesso ressonância nuclear magnética e ao rastreamento por PSA como prevenção ao câncer da próstata.

Sala das Sessões, em \_\_ de \_\_\_\_ de 2024.

ROGÉRIA SANTOS Deputada Federal



